



DOLORE CRONICO DELL'ANCA (COXARTROSI)

Il dolore all'anca è più frequente in terza età ed è solitamente causato da artrosi dell'articolazione coxofemorale. La coxartrosi può essere trattata nelle fasi iniziali con:

- Viscosupplementazioni ecoguidate;
- Iniezione ecoguidata di Plasma arricchito di Piastrine (PRP);
- Iniezione ecoguidata di cellule mesenchimali multipotenti del grasso sottocutaneo;



Nelle condizioni di coxartrosi severa, molti pazienti non vogliono o non sono candidabili alla chirurgia protesica, nonostante la chirurgia protesica sia la terapia di scelta per il trattamento dell'artrosi severa coxofemorale.

In questi casi il trattamento della sintomatologia dolorosa dell'anca può essere raggiunto con una desensibilizzazione dell'articolazione in anestesia locale tramite crioterapia o radiofrequenza.

La procedura si svolge in regime ambulatoriale o di day-hospital e consiste nell'ablazione dei soli rami sensitivi articolari provenienti dai nervi femorale, otturatorio e sciatico.

Prima di procedere all'ablazione nervosa si procede a test di stimolazione per avere la conferma che il nervo da trattare sia il bersaglio sensitivo da trattare, rendendo questa procedura estremamente sicura.

La procedura può essere ripetuta al ripresentarsi dei sintomi, solitamente dopo circa 1 – 2 anni.