



SINDROME DA FALLIMENTO CHIRURGICO SPINALE (FAILED BACK SURGERY SYNDROME - FBSS)

La Sindrome da Fallimento Chirurgico Spinale o FBSS, è un termine usato per descrivere quei pazienti che dopo aver subito un intervento di chirurgia spinale accusano gli stessi dolori preoperatori, anche più intensi, nell'immediato periodo post-operatorio o a distanza di qualche anno.

I sintomi sono caratterizzati da lombalgia intensa e/o dolore radicolare.

Le possibili cause di FBSS sono il tessuto cicatriziale che intrappola le radici nervose, la degenerazione delle faccette articolari adiacenti e della muscolatura paravertebrale.

Per il persistere del dolore molti pazienti vengono sottoposti a revisioni chirurgiche.

La percentuale di successo delle revisioni chirurgiche è molto bassa, 30% dopo la prima, 15% dopo la seconda e 5% dopo la terza revisione.

I trattamenti terapeutici per la FBSS sono:

- Farmacologici;
- Epidurolisi (adesiolisi, sbrigliamento delle cicatrici mediante cateteri o epiduroscopi);
- Radiofrequenza pulsata del Ganglio Dorsale della Radice (Dorsal Root Ganglion - DRG);
- Neurostimolazione spinale, considerato il trattamento più efficace per la FBSS.

